

TRATAMENTE CHEIE PENTRU CAPSUN – productie , anul 2 si 3

Nr. Crt	Perioada aplicării	Boala sau dăunătorul	Denumirea comercială a produsului si numărul tratamentelor cu indicatii	Conc. %	Doza Kg,l/ha
1	Pornirea in vegetatie 2-3 frunze	-Patarea alba, Patarea rosie, Patarea bruna, Arsura bacteriana, Vestejirea plantei	T1 -Champ 77 wg sau Alcupral (produs pe baza de dioxid de cupru) T2 -Foliq Ascovigor la interval de 2-3 ore dupa primul tratament T1	0,4% 0,4%	40 g/10 l apa 40 g/10 l apa 60 ml/10 l apa
2	Înfrunzire Sau la 7-10 zile dupa primul tratament cu cupru se repeta	Patarile frunzelor, boli de radacina	T3 -Champ 77 wg sau Alcupral (NU se da acelasi produs ca in T1) T4 –Fier foliar dupa 5 zile se aplica de la T3 un tratament foliar preventiv cu un produs pe baza de fier sau chelat de fier	0,4% 0,4%	40 g/10 l apa 40 g/10 l apa In functie de produsul folosit indicatii pe sticla
3	Înălțarea inflorescențelor	Patarea alba, Patarea bruna, Fainare, putregaiul coletului -Acarianul capsunului- Gargarita capsunului	T5 Ortiva top + Mospilan 20 SG apoi se respecta 7 zile pauza pana la T6 T6 – Captan 80 WDG+ Floramite Cu o perioada de pauza de 14 zile pana la T7	*1 l/ha **0,02% 0,15%	(dizolvat in 300-1200 l apa/ha) **0,2kg/ha 1.5kg/ha 3.3 – 4,2 ml/ 10 litri apa
4	Scuturarea petalelor	Putregaiul capsunului- patarile frunzelor- insecte defoliatoare	T7- Score 250 EC + Teppeki 240 SC sau Scala + Movento 100 SC (pauza 10 zile) Acaricid Voliam Targo T8 - tratament foliar FOLIQ Micromix cu microelemente	0,025%	2,5 ml/10 l apa 140gr/ha 2 kg/ha(Scala) 1 l /ha 0,6-0,8 l/ha in functie de gradul de infestare
5	Legarea fructelor	Boli de radacina si de frunze	T9 - Aliette 80 wg + Amistar sau Chorus 50 T10 foliar calciu FOLIQ CALMAX	0,25 % Foliq Ca	25 g/10 l apa 0,75- 1l/ha 0,3 kg/ha 60ml/10 l apa
6	Fructe verzi	Putregaiul fructelor si bolile frunzelor daunatori trips	T12 – Signum+Foliq MICROMIX ***In productie tratamente cu fungicide specifice impotriva putregaiului cenusiu ***In cazul atacului cu trips se aplica Laser 240 SC	0,2% 0,7%	20 g/10 l apa 60 ml/10 l apa
7	După recoltare (august – sept.)	Antracnoză, septorioză, pătarile frunzelor, insecte defoliatoare	T13 Topas sau Cidely Top + Mavrik 2 F Foliq MACRO P		0.5 l/ha 1l /ha 0.5 l/ha

ATENȚIE: FENOFAZELE

- In perioadele ploioase si umede din timpul culesului se mai pot aplica fungicide precum Switch sau Teldor in functie de gradul atacului datorat de Botrytis cinerea - putregaiul cenusiu.
- Se va evita aplicarea la temperaturile ridicate din timpul zilei, cand daunatorii sunt putin expusi si fotodegradarea este intensa.
- **NU RECOMANDAM FOLOSIREA PRODUSELOR DECAT CUM ESTE SCRIS SI RECOMANDAT DE CATRE PRODUCATOR, CU CONCENTRATIILE SPECIFICE FIECAREI SPECII SI RESPECTAREA PERIOADELOR DE PAUZA INTRE TRATAMENTE.**

Important! Conform cu noile reglementari ale Uniunii Europene privind ecoconditionalitatea, care prevad ca informatiile despre folosirea produselor de protectia plantelor (ppp) sa fie pastrate cel putin 3 (trei) ani, de catre utilizatorii profesionisti, se impune ca fiecare utilizator de ppp (fermieri, producatori agricoli, etc.) sa detina si sa completeze, la zi, un registru de evidenta a tratamentelor fitosanitare. Respectarea acestei prevederi va fi verificata, in teren, de catre inspectorii APIA si cei ai Oficiului Fitosanitar Judetean. Amenzile pot ajunge pana la 8.000 – 10.000 lei, pentru utilizatorii profesionisti care nu se conformeaza acestei prevederi.